

ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人

(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用後、右記の症状があらわれた場合は副作用の可能性がある

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

ので、直ちに使用を中止し、この説明文を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

3. しばらく使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】 歯周病(歯肉炎・歯周炎)に伴う諸症状(歯肉の出血・発赤・はれ・うみ・痛み・むずがゆさ、口のねばり、口臭)の緩和、口内炎

【用法・用量】 歯周病(歯肉炎・歯周炎):1日2回(朝・晩)ブラッシング後、適量(約0.3g)を指又は歯ブラシにつけて歯肉をマッサージするように磨く。口内炎:1日2~4回、適量を患部に塗る。

〈用法・用量に関する注意〉 (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用されること。(2) 歯科用にのみ使用すること。

【成分・分量】(1g中)

成 分	含 量	作 用
グリチルリチン酸二カリウム	4mg	歯肉や口内の炎症をしのげる(抗炎症作用)
セチルピリジニウム塩化物水和物	3mg	歯周病の原因となる細菌の増殖を抑える(殺菌作用)
パンテノール	4mg	歯肉や口腔粘膜の新陳代謝を促進し、正常な組織へ回復させる(組織修復作用)

添加物として、グリセリン、プロピレングリコール、セルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、γ-シクロデキストリン、酸化チタン、サッカリンNa、リン酸水素Na、ハッカ油、香料、l-メントール、ウイキョウ油、エタノールを含む。

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わることがある。)

サンスター株式会社 〒569-1195 大阪府高槻市朝日町3-1

本品についてのお問い合わせは、ご購入の薬局・薬店 又は下記までご連絡ください。

サンスター株式会社 お客様相談室 電話:0120-102330 受付時間:9:30~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度
電話:0120-149-931

歯周病(歯肉炎・歯周炎)薬 第3類医薬品

サンスター ガム・メディカルペーストEX

2104